

HU Használati útmutató

TARTALOM

Naloc, 10 ml

ÖSSZETEVŐK:

Propilénglikol, karbamid, tejsav, nátrium-hidroxid

LEÍRÁS


A Naloc tiszta, színtelen folyadék. A körömön történő alkalmazást megkönnyítő szilikon cseppentő feltétellel ellátott műanyag tubusban. A Naloc tartósítószerrel és illatanyagot nem tartalmaz. Összetevői biológiailag teljes mértékben lebomlanak.

JAVALLATOK

A Naloc elősegíti a gombás fertőzés vagy pikkelysömör miatt elszíneződött és deformálódott körömök gyógyulását. A Naloc növeli a köröm hidratáltságát, gyengéden kisimítja a körömlemez külső rétegeit, valamint a köröm mikrokozmoszát megváltoztatásával és a körömfelszín épségének helyreállításával megakadályozza a gombák és baktériumok szaporodását. A Naloc javítja a körömök küllemét és megfelelő állapotban tartja azokat. A javulás első jelei rendszerint 2-4 hét kezelés után láthatóak.

ALKALMAZÁS

A Naloc-ot naponta egyszer, lehetőleg este, lefekvés előtt alkalmazza. Helyezze a tubus csúcsát a körömrre. Gyengéden nyomja meg a tubust, és a csúcsával oszlassa szét a készítményt a köröm felszínén.



Minden kezelni kívánt körömöt vékony rétegben vonjon be a készítménnyel. Fontos, hogy a kezelt körömvek alá is juttasson a készítményből. Az alkalmazás után hagyja néhány percig száradni.

A javulás első klinikai jelei 2-4 hét kezelés után jelentkeznek. A kezelés időtartama a köröm kezdeti állapotának súlyosságától függ, de a megfelelő eredmény eléréséhez sok esetben 3-6 hónap kezelés is szükséges lehet. Az optimális eredmény eléréséhez az egészséges köröm kinövéséig folytassa a kezelést. A kezelés ideje alatt ne használjon körömlakkot, mert az csökkenti a Naloc hatékonyságát. A Naloc csak helyileg hat, ezért terhesség és szoptatás ideje alatt is használható. Gyermekeken történő alkalmazással kapcsolatban korlátozott mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre. Ezért gyermekeken történő alkalmazás előtt kérje orvosa tanácsát.

FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK

Csak külsőlegesen használatra! Figyeljen arra, hogy a készítmény ne kerüljön a szembe vagy a nyálkahártyákra. Ne használja a készítményt, ha allergiás (túlérékeny) annak bármely összetevőjére.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Egyes betegeknél előfordulhat a köröm közvetlen környezetében levő bőrfelület kismértékű átmeneti irritációja és a köröm elszíneződése. Előfordulhat továbbá, a köröm meglazulása/elválása a körömágytól (onycholysis), beleértve az érintett körömrész leválását is.

FELHASZNÁLHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

A dobozon és a tubuson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza a készítményt. 2°C-25°C között tárolandó. Napfénytől és fagyástól védve tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

Gyártja:

Moberg Derma AB, Gustavslundsv. 42, SE-167 51 Bromma, Svédország
Magyarországi forgalmazó:

Meda Pharma Hungary Kft. 1139 Budapest, Váci út 91.

A szöveg utolsó módosításának időpontja: 2011. december

CE 0086